

新生児の出血性疾患予防のための

ビタミンK2シロップの予防投与について



ビタミンK2シロップ投与法「3回法」から「3ヶ月法」への変更のお知らせ

2021年の小児科学会等の調査で「3回法」を行ったにも関わらず11例の頭蓋内出血の発症例がありました。一方、「3ヶ月法」を行った症例では頭蓋内出血を発症した症例はなく、問題となる副作用も確認されませんでした。よって、当院では「3ヶ月法」を採用することにしました。

こんなとき、どうしたらいいの？

Q.内服した直後に吐いてしまいました。

A.再度内服する必要はありません。

Q.内服するのを忘れてしまいました。

A.次週内服日に再開してください。

Q.内服する際に薬をこぼしてしまいました。

A.半量以上こぼしてしまった場合は新しい薬を使用してください。不足分は一ヶ月健診で処方しますので、お手持ち分を飲ませておいてください。全部紛失した場合は処方しますので、平日小児科外来までご連絡ください。(1包300円かかります)


Q.内服したことを忘れて2回分内服してしまいました。

A.心配しなくて大丈夫です。

次週も予定通り内服してください。足りなくなる1包分は飲ませなくても構いません。

Q.人工乳でも飲ませるのでしょうか？

A.過剰投与にはならないこと、脳出血を最大限に予防することが目的なので当院では3ヶ月間の内服継続をおすすめしております。



🍬 お薬袋の裏面を服薬チェックとして活用し、母子手帳などに保管しておくといいでしょう。

🍬 シロップの料金は1包300円×13回分=3900円を出産入院費と一緒にいただきます。

🍬 ご不明な点がございましたら、平日日中に小児科外来までご連絡ください。