

ベージニオ®服用中に現れやすい副作用とその対策について

間質性肺炎にともなう症状

- 発熱
- 空咳(乾いた咳)
- 息切れ(普段通りの生活が休憩しないとできない) など

静脈血栓症にともなう症状

- 手足の腫れ・痛み
- 胸苦しさ
- 息切れ
- など

上記の症状を認める場合は、ベージニオ®を休薬し、病院へ連絡

下痢

ベージニオ®の下痢は、服用開始から1週間程度で現れ、ほとんどの方が経験する副作用です。下痢止め(ロペラミド)を上手に服用することやベージニオ®の用量を調節することで症状を和らげることができます。
[下痢止めの服用方法]

下痢をしている(泥状～水様便)

↓ 下痢止めを飲む前に・・・

激しい腹痛、発熱、嘔吐、口渇、血便、黒色便
飲食ができない、めまい、倦怠感などの症状確認

↓ 症状なし

1日2回のロペラミドの服用状況

服用していない

1日2回で処方されている
ロペラミドを服用開始

↓ 症状あり

病院へ
連絡

↓ 服用している

下痢時のロペラミドを1cap服用
(症状がひどければ※2cap服用)

2時間後に下痢が続いている

下痢が改善

下痢時の
ロペラミド
のみ中止

↓ 下痢が改善

ロペラミド継続

↓ 2時間後に下痢が続いている

下痢時のロペラミドを1cap服用
(症状がひどければ※2cap服用)

下痢の症状が
続く場合は
繰り返す

下痢が改善

下痢時の
ロペラミドのみ中止

↓ 24時間でロペラミドを合計8cap(1日2回+下痢時)内服したが下痢が改善しない

ベージニオ®を休薬し、病院へ連絡

※症状がひどい：通常の排便回数+4回以上の下痢や外出などの身の回り以外の日常生活動作の制限がある

下痢とは、どのくらいの便のやわらかさでしょうか？

① ココロ便



硬くてココロの
糞状の便

② 硬い便



ソーセージ状で
あるが硬い便

③ やや硬い便



表面にひび割れのある
ソーセージ状の便

④ 普通便



表面がなめらかで
やわらかい
ソーセージ状の便

⑤ やや軟らかい便



はっきりとした
断片のあるやわらかい
半分固形の便

⑥ 泥状便



端が崩れて、
ふにやふにやの
不定形の便

⑦ 水様便



固形物を含まない
液体状の便